



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شهید بهشتی
مرکز پزشکی، آموزشی، درمانی کودکان مفید

علائم هشدار دهنده در دوران نوزادی



✓ **خنده**

- ♦ فونریزی ، تغییر رنگ و تیره شدن نوک آلت .
- ♦ وره کردن شدید آلت و بیضه
- ♦ ادرار نکردن نوزاد مداکثر ۸ تا ۶ ساعت پس از فتنه
- ♦ ترشح چرکی سر آلت
- ♦ فونریزی مداوم ممل فتنه
- ♦ افتادن ملقه در کمتر از ۳ روز یا نیفتادن ملقه تا ۱۰ روز پس از فتنه
- ♦ قرمزی و ترشح چرکی ممل فتنه یا هر چیزی که به نظر والدین غیر طبیعی بنظر برسد.

رفرنس:

کتاب قدم نورسیده مبارک، انتشارات پشواک آرمان،
تهیه و تدوین: اداره سلامت نوزادان
بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در بیمارستان
درسنامه پرستاری کودکان
newborn intensive care, what every
parents needs to know

در صورت بروز هر یک از نشانه‌های زیر لازم است فوری با پزشک و یا نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی مشورت کنید:

✓ کم آبی

- ♦ از روز ۴ به بعد اگر نوزاد حداقل ۶ بار پوشک خود را خیس نکرده باشد.
- ♦ اگر رنگ ادرار زرد پررنگ شده باشد.
- ♦ اگر کمتر از ۳ بار در ۲۴ ساعت مدفوع داشته باشد.
- ♦ دهان نوزاد خشک است.
- ♦ ملاج او فرو رفته است.

✓ تغذیه

- ♦ نمی تواند پستان را بگیرد یا آن را بعد از گرفتن رها می کند بخصوص در صورتی که قبلا پستان را بفوی می گرفته است.
- ♦ به ممض اینکه پستان را می گیرد به فوای می رود و شیر نمی خورد.
- ♦ مکیدنش ضعیف شده است.
- ♦ برای تغذیه بیدار نمی شود.
- ♦ با هر بار تغذیه استفراغ می کند.

- ♦ بعد از ۲ هفتگی هنوز به وزن زمان تولدش نرسیده است.



- ♦ تب دارد. مرارت زیر بغل بیشتر از ۳۷.۵ درجه سانتیگراد
- ♦ مرارت بدنش کمتر از مد طبیعی است. کمتر از ۳۶.۴ درجه سانتیگراد
- ♦ فیلی می خوابد و سخت بیدار می شود
- ♦ ملاج برجسته شده است
- ♦ تشنج می کند
- ♦ اسهال و یا مدفوع فونی دارد
- ♦ بدنش شل است و بی مال است
- ♦ همیشه بیقراری میکند مگر اگر بغل شود.



- ♦ پوست بدن و چشمهایش زرد شده است
- ♦ سردی بدن و یا دستها و پاها نوزاد
- ♦ رنگ پریده بودن دائمی نوزاد
- ♦ لب ها و زبانش کبود هستند
- ♦ سرفه میکند
- ♦ فرو رفتگی قفسه سینه و ناله کردن.



- ♦ زنش پره های بینی
- ♦ تعداد نفسش بیشتر از ۶۰ بار در دقیقه است.

✓ بند ناف

- ♦ قرمزی و یا ترشح چرکی بند ناف
- ♦ در صورت مشاهده قرمزی، التهاب، ترشح زرد رنگ فراوان و نشست فون در ممل ناف به پزشک اطلاع دهید.
- ♦ در صورتی که پس از ۴ هفته بند ناف نیفتد لازم است مراجعه شود.

