



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شهید بهشتی
مرکز پزشکی، آموزشی، درمانی کودکان مفید

" سیاه سرفه "

منبع : کودک سالم

مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کودکان مفید

کودکان کمتر از هفت سال که واکسن نزده باشند باید واکسیناسیون کامل شوند و کودکانی که ۶ ماه قبل واکسن زده‌اند باید یک نوبت دیگر یاد آور دریافت کنند.

کارکنان مراکز بهداشتی نیاز به دریافت آنتی بیوتیک ندارند اما در صورت سرفه کردن باید سریعاً از نظر سیاه سرفه آزمایش شوند.

در صورت مواجهه با کودک مشکوک به سیاه سرفه باید سریعاً به مرکز بهداشت اطلاع داده شود باید توجه داشت که گاهی در موارد شدید این بیماری و بروز مشکلات شدید تنفسی کودک ممکن است به لوله گذاری داخل تراشه و تنفس کمکی با دستگاه تنفس مصنوعی نیاز پیدا کند.

تغذیه کودک با شیر مادر تحت نظر پزشک معالج می تواند انجام گیرد. همچنین در کودکانی که شیر خشک مصرف می کنند هم تغذیه می تواند انجام شود ولی باید توجه داشت که تعداد دفعات شیردهی را بیشتر کرد و هر بار از دادن حجم زیاد غذا خودداری کرد.

دوره درمان آنتی بیوتیکی باید به طور کامل انجام شود.

ملاقات اعضای فامیل تا ۵ روز اول بعد از درمان آنتی بیوتیکی باید محدود باشد.

کودکانی که در منزل یا مهد کودک با کودک بیمار تماس داشته‌اند باید درمان آنتی بیوتیکی پیشگیرنده دریافت کنند.

یک عفونت حاد تنفسی است که یکی از مسری ترین بیماریهای اطفال زیر ۵ سال است و بیشتر در مناطقی دیده می شود که واکسیناسیون انجام نمی شود. در این بیماری سرفه‌ها شدید و پشت سر هم است و به صورت حمله‌ای می باشد. دوره نهفتگی بیماری ۱۰-۶ روز است.

❖ درمان بیماری با آنتی بیوتیک است.

محیط کودک را باید آرام نگه داشت و از تحریکاتی که باعث بروز گریه شدید و سرفه بدنبال آن شوند تا حد امکان خودداری کرد.

زیرسر کودک را باید بالا نگه داشت. بخور و اکسیژن می تواند برای این کودکان که ترشحات غلیظ و چسبنده دارند کمک کننده باشد.