

برنام خدا

تاریخ برگزاری جلسه: ۹۲/۰۷/۱۱

افراد حاضر در جلسه: خانمها دکتر معماری - دکتر قاسمی و آقایان دکتر دباغ - دکتر سلیمی - دکتر قرایی - دکتر تیموریان - دکتر میرخشتی

نفر اول ارائه کننده: **دکتر فرهاد صولت پور** استاد راهنما: دکتر تیموریان نوع ارائه: پایان نامه

موضوع: مقایسه میزان بروز آسیب های علامت دار گلو در دو روش القاء سریع بیهوشی با استفاده از دوز بالای سیس آتراکوریوم و ساکسینیل کولین

با نمره ۲۰ مورد تصویب قرار گرفت.

نفر دوم ارائه کننده: **دکتر معصومه هاشمی ماد** استاد راهنما: دکتر قاسمی نوع ارائه: پروپوزال

موضوع: بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز کلونیدین، کتامین و پتیدین بر روی میزان بروز لرز پس از عمل در روش بیهوشی اسپاینال در مردان معتاد تحت اعمال جراحی الکتیو ارتوپدی اندام تحتانی

ایراداتی که باید اصلاح گردند:

۱. دمای اتاق عمل به جای 24°C به 23°C تغییر کند.
۲. مشخص شود نوع جراحی ارتوپدی از نوع ساق و پا است. (عملهای یکسان ساق به پایین انجام گیرد)
۳. پس از انجام اسپاینال، داروها تزریق گردد (بر اساس pilot) و لرز حین عمل هم بررسی شود.
۴. تعریف معتاد **opioid abuser** - در ۶ هفته گذشته بصورت روزانه از **opioid** استفاده کرده باشد.
۵. طول عمل جراحی حدوداً ۳ ساعت
۶. کلونیدین قبل از **SA** و پتیدین و کتامین بعد از **SA** و در صورت بروز همودینامیک بیمار قبل از شروع عمل
۷. تغییر عنوان به بررسی اثرات بروفیلاکتیک در بروز حین و پس از عمل
۸. در صورت بروز در حین عمل با گرید ۳ به بالا این ... درمان شود و موارد ثبت شود.

نفر سوم ارائه کننده: **دکتر پریسا باقری** استاد راهنما: دکتر تیموریان نوع ارائه: پروپوزال

موضوع: بررسی اثر اندانسترون بر کاهش لرز پس از بیهوشی عمومی در جراحی های اینتراکرنیال

ایراداتی که باید اصلاح گردند:

۱. افعال به زمان آینده تغییر کند.
۲. در هدف کلی کلمه بررسی به تعیین تغییر کند.
۳. **Base line** همودینامیک بیمار ± 20 باشد.
۴. در صورت بروز تشنج به چه صورت کنترل و درمان میشود، به مطلب اضافه شود.
۵. استفاده از **grading** برای لرز
۶. طول عمل جراحی بعنوان **exclusion** نباشد.
۷. از میریدین در طول عمل و پس از آن استفاده نشود.