

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده پزشکی

پایان نامه
برای دریافت درجه دکتری

موضوع:

بررسی موارد بیماری هنوخ شوئن لاین در سالهای ۷۰-۱۳۶۵
در بیمارستانهای لقمان حکیم و مفید

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر آذر فلاح

نگارش:

فرزانه جمشیدیها - عباسعلی فهزادی

ورودی سال ۶۴

WE
۲
/2400
۱۳۶۴

به نام خدا

چکیده:

در این مطالعه که بصورت پس‌نگرانجام گرفته است، ۴۷ بیمار مبتلا به پورپورای هنوخ شوئن لاین که در بیمارستانهای لقمان و مفیدبستری بوده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

بیماران بین ۶ ماه تا ۱۳ سال سن داشتند. حداکثر شیوع بیماری بین سن ۶-۹ سالگی بود. ۶۸٪ از بیماران را پسرو ۳۲٪ آنها را دختر تشکیل داده بودند.

از نظر فصلی، بیشترین ابتلا در ماه آذر زمستان و دوماً به اول بهار بوده است.

بیماران مورد بررسی در ۱۰۰٪ موارد دارای تظاهرات پوستی، علائم گوارشی در ۶۹/۲٪، درگیری مفصلی در ۷۶/۹٪، درگیری کلیوی در ۲۹/۸٪، تظاهرات سیستم عصبی مرکزی در ۱۰٪ و درگیری اسکروتوم در ۲٪ موارد داشتند.

در دکرامپی شکم شایعترین یافته گوارشی در بیماران بوده و سایر یافته‌های گوارشی، شامل ملنا در ۱۷/۹٪، وجود خون روشن در مدفوع در ۵٪، هماتمزد در ۷٪، تست گایاک مثبت در ۴۱/۷٪ از بیماران بود.

شایعترین یافته ناشی از درگیری کلیوی هماتوری بود. یک نفر از بیماران دچار سندرم نفروتیک شد. ۳۱/۹٪ افراد دارای تب بودند و در ۴۲٪ از افراد سابقه عفونت تنفسی فوقانی قبل از بروز پورپورای هنوخ شوئن لاین وجود داشته است.

تستهای انعقادی در کلیه بیمارانی که انجام شده بود، طبیعی بوده است.

در درمان بیماران، جهت تسکین درد، علاوه بر مسکن‌های غیر استروئیدی، کورتیکو استروئید به ۱/۳ بیماران تجویز شده بود. شایعترین علت برای تجویز کورتیکو استروئید عوارض گوارشی بیماری بود.